


FEBBRE DEL NILO OCCIDENTALE: CONOSCERLA E PREVENIRLA

La Malattia del Nilo Occidentale, o West Nile Disease (WND), è causata da un virus che alberga negli uccelli selvatici e che può essere trasmesso a mammiferi, uccelli, rettili attraverso la puntura di zanzara. In rari casi l'uomo può contrarre il virus, ma non può contagiare altre persone.

IL CICLO DI TRASMISSIONE DEL VIRUS



Il virus
può essere
trasmesso all'uomo
solo dalla
zanzara!

I SINTOMI NELL'UOMO

80%

nessun sintomo

20%

malattia simil-influenzale

(febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei)

-1%

sintomi neurologici. Nello 0,6% dei casi, il virus provoca gravi forme neurologiche (encefalite, meningoencefalite o paralisi flaccida)

LA PREVENZIONE

Non esiste un vaccino per l'uomo. Occorre perciò evitare le punture di zanzara. Come?



- ▶ all'aperto utilizzare repellenti per gli insetti
- ▶ schermare porte e finestre con zanzariere
- ▶ svuotare di frequente sottovasi, secchi, copertoni, barili e altri contenitori in cui è presente acqua stagnante
- ▶ cambiare spesso l'acqua delle ciotole per animali
- ▶ tenere le piscine per i bambini vuote o coperte se inutilizzate
- ▶ trattare con prodotti larvicidi ogni 15 giorni tombini e pozzetti
- ▶ verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite
- ▶ coprire le cisterne e i contenitori dove si raccoglie l'acqua piovana con coperchi ermetici, teli o zanzariere
- ▶ eliminare covatoi dove possono annidarsi volatili infetti

LA TERAPIA

Non esiste una terapia specifica : i trattamenti sono mirati alla cura dei sintomi della malattia. Solo nei casi più gravi è necessario il ricovero in ospedale.